

<医師用>

登園許可証

保育園 施設長 殿

入所児童名 _____

病名 _____

_____ 年 ____ 月 ____ 日 から症状も回復し、
集団生活に支障がない状態になったので、登園可能と判断します。

_____ 年 ____ 月 ____ 日

医療機関 _____

医師名 _____

印又はサイン

保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について意見書の提出をお願いします。

感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育所生活が可能な状態となつてからの登園であるようご配慮ください。

医師が記入した意見書が望ましい感染症

| 感染症名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 麻疹(はしか) | 発症1日前から発しん出現後の4日後まで | 解熱後3日を経過してから |
| インフルエンザ | 症状が有る期間(発症前2-4時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで(乳幼児にあつては3日を経過するまで) |
| 風しん | 発しん出現の前7日から後7日間くらい | 発しんが消失してから |
| 水痘(水ぼうそう) | 発しん出現1-2日前から痂皮形成まで | 全ての発しんが痂皮(かひ)化してから |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ・またはムンプス) | 発症3日前から耳下腺腫脹後4日 | 耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで |
| 結核 | 咳、痰、発熱が2週間以上持続 | 医師により感染の恐れがないと認められるまで |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 高熱、咽頭痛、目やに、結膜の充血 | 主な症状が消え2日経過してから |
| 流行性角結膜炎 | 急な結膜の充血、目やに | 感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから |
| 百日咳 | 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌抗生物質剤による治療を終了するまで |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 下痢(水様)、腹痛、血便 | 症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの |
| 急性出血性結膜炎 | ウイルスが呼吸器から1-2週間、便から数週間~数ヶ月排出される | 医師により感染の恐れがないと認めるまで |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | | 医師により感染の恐れがないと認めるまで |